

PROTOCOLO **MICROABRASIÓN-REMINERALIZACIÓN**



Dra. Rocío Lazo





PROTECCIÓN GINGIVAL





PROTECCIÓN GINGIVAL



Aislar la encía con K-Dam y colocar dique de goma
para aislamiento absoluto



KIYOMI
estética dental



MICROABRASIÓN





K-BLEACH RM 6%

AGENTE EROSIVO-ABRASIVO

- Ácido clorhídrico al 6%
- Carburo de silicio





MICROABRASIÓN- REMINERALIZACIÓN



Aplicar gel 20"

REPETIR EL PROCESO HASTA 3 VECES
EN LA MISMA SESIÓN

Tiempo total 120"



REMINERALIZACI3N





ApaCare[®] Repair

Aplicar ApaCare Repair, dejar actuar 5 minutos y después frotar suavemente cada diente por unos 2 minutos.

Lavar y secar.

Dejar actuar de 5-10 minutos.





ApaCare® Barniz desensibilizante

Aplicar ApaCare Barniz de hidroxiapatita y dejar secar.

**No cepillar durante 12 horas.
El paciente puede comer y beber.**





Durante las 4 semanas en las que estemos realizando el protocolo, el paciente debe utilizar ApaCare Repair en casa.

Aplicar mínimo dos veces al día después del cepillado.

Bajo prescripción médica.



El proceso de microabrasión-remineralización
se realiza una vez por semana.

Hasta un máximo de 4 semanas.





REMINERALIZACIÓN EN CASA



ApaCare[®] Liquid ApaCare[®] Pasta remineralizante

Tras finalizar el mes completo del protocolo, prescribir la pasta de dientes y el enjuague bucal de ApaCare.

Tratamiento mínimo: 6 meses.

